


Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES

Arboriculture

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

☎ 78.63.25.65

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F - Régisseur Recettes DRAF

Bulletin n° 3 - 23 Février 1989

AVIS AUX ABONNES : le coupon d'abonnement vous a été envoyé précédemment.
N'oubliez pas de vous réabonner pour éviter une interruption de votre abonnement.

CLOQUE DU PECHER : le stade sensible à la cloque est atteint
aussi bien dans le Sud de la région que dans les Savoies

MONILIOSE DE L'ABRICOTIER : effectuez un traitement cuprique

CLOQUE DU PECHER

La plupart des variétés de pêches et nectarines ont atteint, voire même dépassé, le stade sensible à la cloque, aussi il est nécessaire de protéger l'ensemble des bourgeons à bois jusqu'à l'étalement des premières feuilles.

En conditions climatiques pluvieuses, renouvelez l'application 12 jours après la première.

Produits utilisables :

captane : 250 g de ma/hl (nombreuses spécialités)
ne doit pas être mélangé à la bouillie bordelaise, aux huiles blanches et aux oléoparathions.

captafol : 120 g de ma/hl (nombreuses spécialités)

ferbame : 175 g de ma/hl (FERBAMATE)
incompatible avec les produits cupriques et les bouillies alcalines.

thirame : 200 g de ma/hl (nombreuses spécialités)
en mélange avec des produits cupriques, on risque d'obtenir un dépôt noir sur feuillage.

zirame : 180 g de ma/hl (nombreuses spécialités)
incompatible avec le cuivre.

.../...

7642

PSYLLES DU POIRIER

Depuis le 6 Février les conditions climatiques ont été favorables à l'application des huiles jaunes, toutefois si ce traitement n'a pu être fait, il est encore réalisable.

Ce traitement doit être effectué par des températures supérieures à 10° C.

MONILIOSE DE L'ABRICOTIER

Cette maladie peut provoquer des dégâts importants, visibles à la floraison.

Lors de printemps froids et humides, la période de floraison est étalée et de ce fait des attaques sérieuses sont à craindre. La protection doit commencer dès le stade C (bouton rouge) en utilisant du cuivre à la dose de 500 g de cuivre métal/hl. Ce fongicide peut être appliqué jusqu'au stade D, c'est-à-dire avant l'apparition des pétales.

Au-delà de ce stade, utilisez des fongicides de synthèse. Sur la variété Bergeron les traitements cupriques peuvent être appliqués dès à présent.

Le cuivre présente également une bonne efficacité envers le Corynéum (maladie criblée) et la bactériose.

Le service de la protection des végétaux et le journal
"LA FRANCE AGRICOLE" s'unissent pour vous proposer :

Les Avertissements Agricoles sur Minitel
36.15 code FA3

- Grandes cultures
- Arboriculture
- Viticulture

PVRACULT
PVRAARBO
PVRAVITI

**la France
agricole**

